




# Hoja de datos de Suicidio de Jóvenes



Estadísticas del estado de Washington <sup>2,3</sup>

**216** Muertes por Suicidio  
En 2017  
10-24 años de edad


Segunda

Cause de

**MUERTE**

Entre jóvenes de los años

**10-24**



Las armas de fuego son el segundo método de suicidio para los jóvenes de Washington


## Datos del condado de Benton Franklin<sup>1</sup>

Cuando se observa el suicidio de jóvenes, existen disparidades definidas en cuanto a quienes tienen mayor riesgo de intentos de suicidio. En los condados de Benton y Franklin, mientras que los estudiantes varones tienen más probabilidades de morir por suicidio, las mujeres tienen casi el doble de tasas que sus homólogos masculinos tanto por la contemplación como por el intento de suicidio. Los jóvenes de color también tienen casi el doble de probabilidades de intentar suicidarse que los estudiantes blancos.

Los estudiantes LGBTQ tienen un riesgo aún mayor, ya que los jóvenes LGBTQ tienen casi tres veces más probabilidades de intentar suicidarse y dos veces más probabilidades de contemplar el suicidio.

**1 de cada 10** estudiantes mujeres intentaron suicidarse

Edades encuestadas 13-18




## Instantanea Nacional<sup>4,5</sup>

El suicidio entre la juventud se ha triplicado desde los años 1940 con el suicidio que es la tercera causa principal de la muerte para la juventud entre los años de 10-24. Los años 18-25 tienen el precio más alto de pensamientos suicidas entre todas las categorías de edad.

Past Year Prevalence of Suicidal Thoughts Among U.S. Adults (2016)

Data Courtesy of SAMHSA



# Factores de Riesgo


## Juventud de Benton-Franklin<sup>1</sup>

Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de muerte de una persona por suicidio. La encuesta Healthy Youth Survey controla algunos de los factores de riesgo, incluida la depresión en el último año, el consumo de alcohol y el acceso a medidas

de protección, como unión a familia y comunidad. Los estudiantes femeninos contemplaron probablemente harán un informe casi dos veces como habiéndose sentido deprimidos en el año pasado que sus homólogos machos. Los estudiantes de LGBTQ dejaron atrás a sus homólogos directos en factores de riesgo como depresión y uso de alcohol, también teniendo precios inferiores de factores protectores relacionados con connectedness, como tener un adulto confiado al que ellos podrían girar sintiéndose triste o sintiendo desesperados y oportunidades de la participación positiva en el ajuste de familia.



## Benton-Franklin LGBTQ Youth Specific Data:



## Citas

1. Washington State Healthy Youth Survey. 2016. Raw data analyzed by Benton-Franklin Health District for bi-county results in August 2018.
2. Washington Department of Health Center for Health Statistics. 2017.
3. Washington State Department of Health. 2018. Youth Suicide FAQs.
4. Centers for Disease Control and Prevention. September 2017. Suicide Among Youth.
5. National Institute of Mental Health. May 2018. Suicide Statistics.
6. American Foundation for Suicide Prevention. 2018. Risk Factors and Warning Signs. <https://afsp.org/about-suicide/risk-factors-and-warning-signs/>

## Factores de riesgo nacionales<sup>6</sup>



Depresión o otros trastornos mentales

Dolor crónico u otras condiciones



Abuso de sustancia



Tener armas o armas de fuego en el hogar.



Historia familiar

Recientemente liberado de la cárcel



Exposición al comportamiento suicida